

Biocondil + NC2

Cartilage* 3 months Knorpel* 3 Monate



S.A. Laboratoires Pharmaceutiques TRENKER
N.V. Farmaceutische Laboratoria TRENKER
Avenue Thomas Edison, 32
BE • 1402 Thines • Belgium



Glucosamine HCl + Chondroitin SO₄
Glucosamin HCl + Chondroitin SO₄

Native type II collagen + Vitamine C
Natives Typ-II-Kollagen + Vitamine C

180 tablets
Tabletten + 90 capsules
Kapseln



* La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour la fonction normale des cartilages.
* Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van kraakbeenen.
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
* Vitamin C fördert die normale Bildung von Kollagen und stellt so die normale Knorpelfunktion sicher.

Biocondil

- 2 comprimés par jour en une fois, avec un verre d'eau, de préférence pendant le repas principal.
- 2 tabletten in één innamen per dag met een glas water, bij voorkeur tijdens de hoofdmaaltijd.
- 2 tablets daily to be taken at once with a glass of water, preferably during the main meal of the day.
- 2 Tabletten pro Tag auf einmal mit einem Glas Wasser einnehmen, vorzugsweise bei der Hauptmahlzeit.

EN : Food supplements (Read note before use). • **Biocondil:** 2 tablets daily to be taken at once (daily intake). **Ingredients per 2 tablets:** D-glucosamine hydrochloride 1500 mg (1250 mg glucosamine). Chondroitin sulphate: 1200 mg. Bulking agents: povidone, hypromellose. Vitamin C: 40 mg (sodium L-ascorbate, 50% AR). Anti-caking agent: magnesium stearate. Bulking agent: isomalt. Colour: calcium carbonate. Anticaking agents: silica dioxide, stearic acid. Coating agent: ethyl cellulose. • **NC2:** 1 capsule daily. **Ingredients per capsule:** Filling agents: corn starch, pregelatinised starch. Capsule: hypromellose. 40 mg standardized cartilage containing 10 mg of total collagen (including native type II collagen (undenatured)), 12 mg vitamin C (sodium L-ascorbate, 15% RI). Anti-caking agent: silica dioxide. **USE:** oral use. Do not exceed the recommended daily intake. A food supplement does not substitute a varied and balanced diet, nor a healthy lifestyle. **STORAGE:** keep out of reach of children. Store in its packaging of origin in a dry and ventilated place. Use preferably before the date mentioned on the packaging.

DE: Nahrungsergänzungsmittel (vor Gebrauch bitte die Packungsbeilage lesen). • **Biocondil:** 2 Tabletten auf einmal pro Tag einnehmen (Tagesdosis). **Inhaltsstoffe je 2 Tabletten:** D-Glucosaminhydrochlorid 1500 mg (1250 mg Glucosamin). Chondroitinsulfat: 1200 mg. Füllstoffe: Povidon, Hypromellose. Vitamin C: 40 mg (Natrium-L-Ascorbat, 50% AR). Trennmittel: Magnesiumstearat. Füllstoff: Isomalt. Farbstoff: Calciumcarbonat. Trennmittel: Siliciumdioxid, Stearinsäure. Überzugsmittel: Ethylcellulose. • **NC2:** 1 Kapsel täglich. **Inhaltsstoffe je Kapsel:** Füllstoffe: Maisstärke, vorverkleisterte Stärke. Kapsel: Hypromellose. 40 mg standardisierter Knorpel, der 10 mg Gesamtkollagen (enthält natives [nicht denaturiertes] Typ-II-Kollagen), 12 mg Vitamin C (L-Natriumascorbat, 15 % RM) enthält. Trennmittel: Siliciumdioxid. **ANWENDUNG:** orale Anwendung. Zum Einnehmen. Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Ist kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. **AUFBEWAHRUNG:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. In der Originalverpackung kühl und trocken lagern. Verwendbar bis: siehe Verfallsdatum auf der Verpackung.

Glucosamine HCl + Chondroitine SO₄

Collagène de type II natif + Vitamine C
Natief collageen type II + Vitamine C

Biocondil + NC2

Cartilage* 3 mois Kraakbeen* 3 maanden

180 comprimés
tabletten + 90 gélules
capsules



Poids net / Netto gewicht / Net weight / Nettogewicht: 290 g



- 1 gélule par jour à jeun, avec un verre d'eau.
- 1 capsule per dag op een nuchtere maag, met een glas water in te nemen.
- 1 capsule daily on an empty stomach with a glass of water.
- 1 Kapsel pro Tag auf nüchternen Magen mit einem Glas Wasser einnehmen.

FR : Compléments alimentaires (Lire la notice jointe avant utilisation). • **Biocondil :** 2 comprimés en une prise par jour (portion journalière). **Ingrédients par 2 comprimés:** Chlorhydrate de D-glucosamine 1500 mg (1250 mg de glucosamine). Sulfate de chondroïtine : 1200 mg. Agents de charge : povidone, hypromellose. Vitamine C : 40 mg (L-ascorbate de sodium, 50% AR). Antiagglomérant : stéarate de magnésium. Agent de charge : isomalt. Colorant : carbonate de calcium. Antiagglomérants : dioxyde de silice, acide stéarique. Agent d'enrobage : éthylcellulose. • **NC2 :** 1 gélule par jour. **Ingrédients par gélule :** Agents de charge : amidon de maïs, amidon pré-gélatinisé. Gélule : hypromellose. 40 mg de cartilage standardisé contenant 10 mg de collagène total (incluant le collagène de type II natif (non dénaturé)), 12 mg de vitamine C (L-ascorbate de sodium, 15% AR). Antiagglomérant : dioxyde de silice. **UTILISATION :** administration orale. Ne pas dépasser la portion journalière recommandée. Ne se substitue pas à un régime alimentaire équilibré et varié ainsi qu'à un mode de vie sain. **CONSERVATION :** tenir hors de portée des enfants. A conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. A consommer de préférence avant la date figurant sur l'emballage.

NL: Voedingssupplementen (Voor gebruik bijgevoegde nota lezen). • **Biocondil:** 2 tabletten in één innamen per dag (dagelijkse innamen). **Ingrédients per 2 tabletten:** D-glucosamine hydrochloride 1500 mg (1250 mg glucosamine). Chondroitinesulfaat: 1200 mg. Vulstoffen: povidon, hypromellose. Vitamine C: 40 mg (natrium L-ascorbaat, 50% AR). Antiklontermiddel: magnesiumstearaat. Vulstof: isomalt. Kleur: calciumcarbonaat. Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, stearinezuur. Coatingmiddel: ethylcellulose. • **NC2:** 1 capsule per dag. **Ingrédients per capsule:** Vulmiddelen: maïszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel. Capsule: hypromellose. 40 mg gestandaardiseerd kraakbeen bevattende 10 mg totaal collageen (waarvan natief collageen type II (niet gedatureerd)), 12 mg vitamine C (L-natriumascorbaat, 15% RI). Antiklontermiddel: siliciumdioxide. **GEBRUIK:** orale toediening. De aanbevolen dagelijkse innamen niet overschrijden. Vervangt geen afwisselende en evenwichtige voeding, noch een gezonde levensstijl. **BEWARING:** buiten bereik van kinderen houden. In zijn oorspronkelijke verpakking en op een koele en droge plaats bewaren. Tenminste houdbaar tot: zie datum vermeld op de verpakking.