



| Analyse nutritionnelle Voedingsanalyse | Pour 1 comprimé | Par 100 gr |
|---|-----------------|------------|
| | Voor 1 tablet | Per 100 gr |
| Protides / Eiwitten (gr) | 0,1 | 1,0 |
| Lipides / Vetten (gr) | Traces | 0,3 |
| Glucides / Koolhydraten | 0,60 | 0,8 |
| Kcal | 1,60 | 19,7 |
| Kj | 6,69 | 82,45 |

Dyna+ SARL
16A, av. de la Liberté
1930 Luxembourg
www.reductin.lu

Poids net:
Netto gewicht: 18gr



Complément alimentaire aux vitamines et minéraux
Voedingssupplement met vitaminen en mineralen
avec édulcorants / met zoetstoffen

| INGRÉDIENTS INGREDIËNTEN | Pour 100g Voor 100g | 2 comprimés 2 tabletten | % AJD / ADH pour 2 comprimés voor 2 tabletten |
|--|------------------------|----------------------------|---|
| Isomalt E953 | 37,52g | 337,68mg | - |
| Extrait de cannelle (écorce) Kaneelextract (schors) Cinnamomum verum | 16,6g | 150 mg | - |
| Cellulose microcristalline E460 Microkristallijne cellulose E460 | 37,52g | 18mg | - |
| Crocus Sativus Satiereal® (extrait de safran) (saffraan-extract) | 37,52g | 50mg | - |
| Crospovidone E1202 Crospovidon E1202 | 5g | 45mg | - |
| Arôme orange 3% Sinaasappel aroma 3% | 3g | 27mg | - |
| Stéarate de magnésium E470B Magnesiumstearaat E 470B | 1,88g | 17mg | - |
| Sucralose E957 | 0,08g | 0,72mg | - |
| Chrome picolinate (Chrome 12%) Chroompicolinaat (Chroom 12%) | 0,06g | 0,6mg | 58,4% |

REDUCTIN INSTANT® contient une formulation brevetée.

1. Indication:

REDUCTIN INSTANT® contient du chrome qui contribue au maintien d'une glycémie normale.

2. Conseil d'utilisation:

2 comprimés à sucer/jour

3. Mode d'emploi:

Voie orale. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée sans avis médical. Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée, et à un mode de vie sain. Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la dépression.

REDUCTIN INSTANT® bevat een gepatenteerde formulering.

1. Werking:

REDUCTIN INSTANT® bevat Chroom wat bijdraagt tot het behouden van een normaal suikergehalte.

2. Gebruiksadvies:

2 smelttabletten/dag

3. Gebruiksaanwijzing:

Oraal gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden zonder medisch toezicht. Vervangt in geen enkel geval een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van depressiebehandeling.