



infacol[®]
SIMETICON / SIMÉTHICONE

Bij vastzittende lucht,
buik- en darmkrampjes
Contre les gaz et les coliques
Bei festsitzender Luft,
Bauch- und Darmkrämpfen

**GESCHIKT OM VANAF DE
GEBOORTE TE GEBRUIKEN
CONVIENT DÈS LA NAISSANCE
KANN AB DER GEBURT
ANGEWENDET WERDEN**

> BEVAT GEEN SUIKER,
ALCOHOL EN KLEURSTOFFEN
SANS SUCRE, ALCOOL NI COLORANT
ENTHÄLT WEDER ZUCKER NOCH
ALKOHOL NOCH FARBSTOFFE
MEDISCH HULPMIDDEL -
DISPOSITIF MEDICAL -
MEDIZINPRODUKT

Hoofdbestanddeel: simeticon 40 mg/ml.
**BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BEWAREN**

Composant principal : siméthicone 40 mg/ml.
**CONSERVER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS**

**FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH
AUFBEWAHREN**






Distributeur :
Teva Pharma Belgium,
Laarstraat 16, 2610 Wilrijk

Inhoud 50 ml
Contenu 50 ml

CE 0482 ©2012



infacol[®]

SIMETICON / SIMÉTHICONE

- helpt bij darmkrampjes
- helpt bij buikkrampen
- helpt vastzittende lucht te bevrijden
- sinaasappelsmaak
- vanaf de geboorte te gebruiken
- gebruiksvriendelijke plastic pipet
- ongeveer 100 dosissen
- Soulage les coliques
- Aide à évacuer les gaz
- Arôme d'orange
- À utiliser dès la naissance
- Pipette en plastique facile à utiliser
- Environ 100 doses



Infacol orale-suspensie is speciaal ontwikkeld ter verlichting van buik- en darmkrampjes bij baby's en helpt vastzittende lucht te bevrijden.

Dosering: een gevulde pipet (0,5 ml) voor elke voeding toedienen. Indien noodzakelijk kan dit tijdelijk verhoogd worden tot twee gevulde pipetten (1 ml).

Toediening: schud het flesje. Vul de pipet door twee keer in het rubberen ballonnetje te knijpen. Veeg de overtollige vloeistof af aan de binnenzijde van het flesje. Om toe te dienen, knijp in het rubberen ballonnetje en druppel op de tong.

Vraag medisch advies als de symptomen aanhouden.

Infacol suspension orale a été spécialement développé pour soulager les bébés des coliques et les aider à évacuer les gaz.

Posologie : administrer une pipette remplie (0,5 ml) avant chaque repas. Au besoin, cette dose peut être temporairement portée à deux pipettes remplies (1 ml).

Administration : agitez le flacon. Remplissez la pipette en pressant à deux reprises le capuchon en caoutchouc. Éliminez l'excédent de produit en passant la pipette sur le rebord du goulot. Pour administrer Infacol, pressez le capuchon en caoutchouc et déposez les gouttes sur la langue du bébé.

Demandez conseil à votre médecin en cas de persistance des symptômes.



Merckle GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Germany